

NaCl 0,9% B. Braun

Skyllenvæske,

steril og endotoksinfri

Virkestoff og styrke

1000 ml væske inneholder:

Natriumklorid	9,00 g
Sterilt vann til	1000 ml
Elektrolyttinnhold:	mmol/l
Na ⁺	154
Cl ⁻	154

Indikasjoner

Skylling og vasking ved kirurgiske inngrep

Skylling av sår og brannskader

Fukting av sårtamponger, bandasjer og kompresser

Skylling og vasking av blærekateter

Skylling og vasking ved behandling av stomier

Rensing og vasking av instrumenter og utstyr

Intra- og postoperativ skylling (endoskopiske undersøkelser uten høyfrekvent strøm, etter inngrep med transuretral reseksjon)

Fylling av respiratoriske luftfuktere (det er anbefalt å bruke pakninger på 100 ml eller mer)

Mekanisk skylling av øyne (det er anbefalt å bruke pakning på 30 ml)

Neseskylling (det er anbefalt å bruke pakning på 30 ml)

Dosering

Avhengig av bruksområdet

Overdosering

Overdosering ved sårskylling eller ved tilførsel peroperativt, kan føre til absorpsjon av skyllenvæsker. Dette kan føre til hypervolemi og hypoton hydrering (hyponatremi).

Symptomer er hodepine, kvalme, uro og forvirring. I alvorlige tilfeller kan koma-liknende tilstander oppstå.

Tiltak ved overdosering

Avbryt behandlingen, korriger pasientens væske- og elektrolytt-balanse.

Advarsler og forholdsregler

Må ikke infunderes. Løsningen kan kun brukes når forseglingen er ubrutt og løsningen er klar. Skyllenvæsken må brukes innen 1 dogn etter anbrudd. Gjenbruk av enheter til engangsbruk medfører risiko for pasient eller bruker. Det kan føre til kontaminering og/eller nedsatt funksjonsevne. Kontaminering og/eller begrenset funksjons-

evne for enheten kan føre til skade, sykdom eller død hos pasienten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved fare for absorpsjon av større mengder løsning, for eksempel ved bruk i store kroppshuler eller store såroverflater, skal løsningen ikke brukes hos pasienter i en tilstand av hyperhydrasjon. Under slike forhold skal den brukes med forsiktighet hos pasienter med

- hypertonisk dehydrering
- hyperkalemi
- hypernatremi
- hyperkloremi
- forstyrrelser der begrenset av natriuminntak er indisert, slik som hjerteinsuffisiens, generalisert ødem, lungeødem, hypertoni, eklampsi, alvorlig nyreinsuffisiens. NaCl 0,9% B. Braun må ikke brukes til intratekal irrigasjon.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Holdbarhet

Holdbarhetsdato er angitt på den enkelte pakning.

Siste oppdatering

0116